

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE

w sprawie zagrożenia wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu (ND)

W związku z wyznaczeniem powiatu jako obszaru o **umiarkowanym ryzyku** wystąpienia rzekomego pomoru drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina wszystkim hodowcom o obowiązku zachowania szczególnych zasad ostrożności.

Rzekomy pomór drobiu (Newcastle Disease) jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, która może prowadzić do 100% śmiertelności w stadzie. **Choroba ta podlega obowiązkowi zwalczania** z urzędu.

Kluczowe działania prewencyjne:

- Szczepienia ochronne:** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z 25 kwietnia 2025 r., na terenie całego kraju obowiązują szczepienia w stadach komercyjnych. PLW może nakazać dodatkowe szczepienia w chowie przyzagrodowym.
- Bioasekuracja:** Nakazuje się bezwzględne przestrzeganie zasad izolacji drobiu od dzikiego ptactwa.
- Monitoring:** Każdy przypadek nagłych padnięć lub spadku nieśności musi być niezwłocznie zgłoszony do Inspekcji Weterynaryjnej.

INSTRUKCJA DLA HODOWCÓW

Zasady ochrony gospodarstwa przed wirusem ND

I. Zabezpieczenie budynków i terenu

- Izolacja:** Trzymaj drób w zamkniętych pomieszczeniach. Uniemożliw kontakt z dzikimi ptakami (siatki w oknach, zadaszone wybiegi).
- Karmienie:** Podawaj paszę i wodę wyłącznie wewnątrz budynków. Nie stosuj wody ze zbiorników otwartych.
- Maty:** Wyłóż maty dezynfekcyjne przed wejściami do kurników i wjazdami na teren gospodarstwa. Pamiętaj o regularnym nasączeniu ich środkiem odkażającym.

II. Higiena i obsługa

- Odzież ochronna:** Stosuj dedykowane ubrania i obuwie używane wyłącznie przy obsłudze drobiu.
- Higiena osobista:** Myj i odkażaj ręce po każdym kontakcie z ptakami.
- Ograniczenie wizyt:** Wprowadź zakaz wstępu osobom postronnym na teren fermy. Prowadź rejestr osób i pojazdów.

III. Zarządzanie stadem

- **Pochodzenie ptaków:** Kupuj drób i jaja wylęgowe wyłącznie z pewnych źródeł, posiadających świadectwa zdrowia.
- **Kwarantanna:** Nowo zakupione ptaki izoluj od reszty stada przez min. 14 dni.
- **Dokumentacja:** Zachowuj aktualne zaświadczenia o przeprowadzonych szczepieniach przeciwko ND.

Co powinno Cię zaniepokoić?

- Gwałtowne padnięcia drobiu bez wyraźnej przyczyny.
- Objawy nerwowe: skręty szyi, drżenia, niedowład.
- Dusznosc i obrzęki głowy.
- Silna, wodnista biegunka.

W przypadku podejrzenia choroby: Natychmiast odizoluj stado i zadzwoń do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Instrukcja skutecznej dezynfekcji (Zasady 4P)

Aby dezynfekcja była skuteczna w obszarze ryzyka, należy przestrzegać poniższych zasad:

1. **Pierwszeństwo czystości: Dezynfekcja nie działa na brud.** Przed użyciem środka chemicznego, powierzchnie (podłogi, ściany, karmidła) muszą zostać dokładnie oczyszczone mechanicznie i umyte. Organiczne zanieczyszczenia (obornik, ściółka) neutralizują działanie wielu środków.
 2. **Prawidłowe stężenie:** Zawsze stosuj stężenie robocze zalecane przez producenta dla wirusów (zazwyczaj od 0,5% do 2%). Zbyt niskie stężenie nie zabije wirusa, a zbyt wysokie może być toksyczne dla ptaków.
 3. **Pilnowanie wilgotności (Maty):** Maty dezynfekcyjne muszą być stale wilgotne. W czasie upałów lub mrozów wymagają częstszego uzupełniania. Środek na macie powinien być wymieniany co najmniej co 2-3 dni (lub gdy jest widocznie zabrudzony).
 4. **Podwójna bariera:** Stosuj dezynfekcję zarówno przy bramie wjazdowej (koła pojazdów), jak i bezpośrednio przy wejściu do każdego kurnika (obuwie).
-

Dodatkowe zalecenia PLW dotyczące dezynfekcji

- **Dezynfekcja linii pojenia:** Wirus ND może rozprzestrzeniać się przez wodę. Raz na cykl lub w sytuacjach zagrożenia należy przeprowadzić sanityzację systemu pojenia atestowanymi preparatami.
- **Zamgławianie:** W dużych obiektach, w strefach umiarkowanego ryzyka, PLW może zalecić dezynfekcję metodą zamgławiania (tzw. "sucha mgła"), która dociera do trudnodostępnych miejsc w konstrukcji dachu i wentylacji.

Uwaga: Przed zakupem sprawdź, czy dany preparat posiada aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Tabela: Skuteczne substancje i preparaty

Rodzaj preparatu	Przykładowe produkty	Zastosowanie
Utleniacze (Sól potasowa)	Virkon S, Mulan	Maty dezynfekcyjne, dezynfekcja powierzchni, oprysk pomieszczeń.
Aldehydy i Czwartorzędowe sole amonowe	Virocid, Aldekol DES	Dezynfekcja pojazdów, sprzętu i hal inwentarskich.
Związki chloru	Chloramina T, Podchloryn sodu	Dezynfekcja ogólna, rzadziej w obecności zwierząt (drażnią drogi oddechowe).
Kwasy organiczne	CID 20, Ecocid S	Dezynfekcja systemów pojenia, powierzchni gładkich.